

Bécasseau maubèche

Calidris canutus rufa

STATUT

En voie de disparition 

En voie de disparition 

Nouvelle-Écosse

Il reste moins de 15 000 bécasseaux maubèches de la sous-espèce *rufa*. Certains individus visitent les côtes de la Nouvelle-Écosse durant leur migration en été et à l'automne. Ils hivernent dans le sud de l'Amérique du Sud.

Aire de répartition de la population



© GREG LASLEY

Description de l'espèce

Le bécasseau maubèche de la sous-espèce *rufa* est un oiseau de rivage de taille moyenne (25 à 28 cm) qui a une petite tête et un bec mince et droit. En plumage hivernal, l'espèce a le dos gris pâle (le contour de ses plumes est blanc), la poitrine striée gris brun, les parties inférieures blanches et les pattes grises. Le juvénile a une apparence similaire, mais une bande noire borde l'intérieur du contour blanc de ses plumes, ses parties inférieures sont chamois et ses pattes sont vert jaune. En plumage nuptial, le bécasseau maubèche a la poitrine, le cou et la face de couleur marron. Ses parties inférieures sont blanches, ses pattes sont foncées et son dos est brun, orné de rayures rougeâtres, havane et noires.

Habitat

Les aires d'hivernage et les haltes migratoires du bécasseau maubèche sont des zones côtières comportant de grands estrans sableux et vaseux, où il peut se nourrir d'invertébrés. Il fréquente également les bancs de tourbe, les marais salants, les lagunes saumâtres et les moulières. Il s'accouple en Arctique, dans des habitats dénudés.



© BRENNAN CAVERHILL, PARCS CANADA



© BRENNAN CAVERHILL

Durant sa migration, le bécasseau traverse la Nouvelle-Écosse le long des côtes, en été et à l'automne. Des adultes au plumage nuptial terni sont observés en juillet et en août, et des juvéniles sont surtout observés d'août à octobre.

Faits intéressants

- Le bécasseau maubèche migre entre les aires d'hivernage en Arctique jusqu'à la pointe sud de l'Amérique du Sud.
- La sous-espèce *nufa* a connu un déclin de 70 % au cours de la dernière décennie.
- Si d'importants efforts de conservation ne sont pas déployés, l'espèce pourrait disparaître d'ici dix ans.
- Les mâles accompagnent les oisillons jusqu'à ce que ces derniers prennent leur envol.

Espèces similaires

Remarque : La barge, le courlis, la bécassine et la bécasse sont des espèces similaires, mais on peut les distinguer par leur taille et leur habitat.

Bécasseau sanderling :

Plus petit (20 cm); bec noir plus court; partie supérieure brunâtre ou grise tachetée; pattes noires; souvent aperçu en grand nombre au bord de l'eau.



Plumage d'un juvénile

Chevalier semipalmé :

Plus grand (35 à 40 cm); dos d'un gris plus pâle; se distingue en vol par le motif noir et blanc sur ses ailes.



Menaces à la survie de l'espèce

- Le grave déclin du nombre d'œufs de limule (une source de nourriture essentielle durant la migration) en raison de la surpêche dans la baie du Delaware.
- La réduction de l'habitat utilisé durant la migration (en raison d'activités comme le drainage des terres humides).
- La perturbation, les conditions météorologiques violentes, la pollution par les hydrocarbures et le changement climatique.



© DON CHERNOFF



© DON CHERNOFF

Limule

Ce que vous pouvez faire

Évitez de déranger le bécasseau et les autres oiseaux de rivage. Appuyez le moratoire sur la pêche du limule dans la baie du Delaware et la protection des rivages, en particulier des aires d'alimentation importantes sur les routes de migration. Participez à des programmes de surveillance, comme le Relevé des oiseaux de rivage des Maritimes.



© DON CHERNOFF

Organismes à contacter, renseignements, rapports d'observation et possibilités d'intendance

Organismes à contacter : Environnement Canada, 902-426-4196 ou www.ec.gc.ca

Renseignements : www.registrellep.gc.ca, www.dcwild.com (photos, en anglais seulement)

Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca

Possibilités d'intendance : Coordonnateur du Relevé des oiseaux de rivage des Maritimes : 506-364-5044