

# Bruant des prés

*Passerculus sandwichensis princeps*

STATUT


Préoccupante 

Vulnérable 

25

Nouvelle-Écosse

Le bruant des prés de la sous-espèce *princeps* niche presque exclusivement dans l'île de Sable. On estime sa population à 6 000 individus. Il hiverne le long des côtes de la Nouvelle-Écosse jusqu'au sud-est des États-Unis.



© HANS TOOM

## Description de l'espèce

Le bruant des prés de la sous-espèce *princeps* a un plumage gris pâle, ses parties supérieures sont gris brun, sa poitrine est ornée de minces rayures gris brun, et ses parties inférieures sont blanchâtres. Au printemps et en été, il a une rayure jaune au-dessus de l'oeil. Sa queue est ombrée et légèrement encochée.



© GRANT MILROY

En automne et en hiver, la rayure jaune au-dessus de l'oeil est plus faible.

## Habitat

Il s'accouple dans l'île de Sable dans des endroits dominés par la bruyère ou dans des dunes et sur des plages où l'ammophile pousse en touffes denses. Il hiverne dans les dunes extérieures, dans le couvert herbacé et les endroits abrités (vallées).



© ENVIRONNEMENT CANADA



© HANS TOOM

Il est habituellement observé dans l'île de Sable en été. Durant la migration, en avril et en octobre, on l'aperçoit sur des plages de la partie continentale, où quelques individus demeurent durant l'hiver.

## Faits intéressants

- Ce bruant est mieux adapté à la vie dans les dunes côtières, donc plus pâle et plus gros que celui de la sous-espèce *savanna*.
- Ces deux sous-espèces de bruant s'accouplent à l'occasion.
- Il est le seul oiseau chanteur connu qui niche en grand nombre dans l'île de Sable.



© IAN McLAREN



© HANS TOOTH

## Espèces similaires

Le plumage gris pâle de la sous-espèce *princeps* est l'une des principales caractéristiques permettant de la distinguer des autres bruants.

### Bruant des prés

**de la sous-espèce *savanna* :**  
Plus petit; plumage plus foncé; rayures plus foncées et plus larges sur la poitrine.



© HANS TOOTH

### Bruant chanteur :

Pas de rayure jaune sur la face; rayure malaire ou « moustache » triangulaire; rayure pâle au centre de la calotte.



© HANS TOOTH

## Menaces à la survie de l'espèce

- Les aires de reproduction convenables dans l'île de Sable sont limitées et peuvent être menacées par l'érosion.
- La mortalité durant la migration.
- La perte d'habitat et la perturbation des aires d'hivernage.



© ENVIRONNEMENT CANADA

Île de Sable

## Ce que vous pouvez faire

Apprenez à reconnaître les oiseaux rares et signalez toute observation. Appuyez la conservation de l'île de Sable et des habitats dans les dunes.

**Organismes à contacter, renseignements, rapports d'observation et possibilités d'intendance**

**Organismes à contacter :** Environnement Canada, 506-364-5044 ou [www.ec.gc.ca](http://www.ec.gc.ca)

**Renseignements :** [www.registrellep.gc.ca](http://www.registrellep.gc.ca)

**Rapports d'observation :** 1-866-727-3447 ou [sightings@speciesatrisk.ca](mailto:sightings@speciesatrisk.ca)

**Possibilités d'intendance :** Études d'oiseaux Canada, 1-888-448-2473 ou [www.bsc-eoc.org](http://www.bsc-eoc.org)

© LIVIA GOODBRAND



Recherche, île de Sable