

Sterne de Dougall

Sterna dougallii



© TED D'ÉON

Description de l'espèce

La sterne de Dougall est un oiseau de mer qui ressemble à un petit goéland (33 à 41 cm). Son bec est long, mince et noir en mai, mais sa base devient rouge au fil de l'été. Son corps est blanc, sa tête est noire et sa queue est très prononcée. Sa poitrine est parfois teintée de rose. Les adultes ont des pattes rouge vif et les oisillons ont des pattes noires. La sterne de Dougall émet un *skivick* ou un *zraaach* criard.



© TED D'ÉON


On peut distinguer la sterne de Dougall en vol par sa longue queue fourchue et son bec noir.

STATUT

En voie de disparition 

En voie de disparition 

On trouve de 80 à 120 couples reproducteurs dans des îles le long des côtes de la Nouvelle-Écosse. Ils hivernent en Amérique du Sud, de la Colombie au Brésil.



Aire de répartition de la population

Île de Sable 

Habitat

La sterne de Dougall s'accouple au sein de vastes colonies de sternes pierregarins et arctiques dans des îles au large des côtes, dans des secteurs dépourvus de végétation ligneuse. Les nids (ou nichoirs), sur des îles sans prédateurs et près des aires d'alimentation, sont souvent construits dans de l'herbe courte ou dans des prés où les oisillons peuvent se cacher eux-mêmes.



© TED D'ÉON

Nichoirs



© ENVIRONNEMENT CANADA

On observe habituellement la sterne de Dougall au sein de colonies de sternes mixtes, de mai à septembre, dans des haltes migratoires, des aires de repos et des aires d'alimentation.

Faits intéressants

- Pour attraper un poisson, la sterne survole les eaux avant de plonger en piqué.
- Elle peut parcourir jusqu'à 20 km pour trouver du poisson.
- Elle peut s'hybrider avec la sterne pierregarin et la sterne arctique.
- La sterne de Dougall a été nommée ainsi en l'honneur du Dr MacDougall, qui l'a observée pour la première fois en 1812.




© TED D'ÉON

Espèces similaires

Estorlet (Acadien)

Sterne pierregarin :

Taille similaire (31 à 38 cm); bec un peu plus court, de couleur orange à l'extrémité noire; corps gris tacheté; les adultes et les oisillons ont les pattes jaunes ou orange; émet un cri moins strident.



Sterne arctique :

Taille similaire (28 à 39 cm); bec rouge, plus court; corps tacheté ou gris; pattes courtes orange; émet un cri moins strident; les oisillons ont les pattes orange ou rouges.



© ENVIRONNEMENT CANADA 2007

Menaces à la survie de l'espèce

- La prédation par d'autres oiseaux (goéland, hibou, corneille, corbeau, faucon) et le vison.
- La perturbation par l'homme.
- La perte d'habitat dans les îles au large des côtes.
- La mortalité dans les aires d'hivernage.

© BLUENOSE COASTAL ACTION FOUNDATION



Ce que vous pouvez faire

Surveillez les colonies d'oiseaux de mer dans les îles, de juin à août. La présence de colonies peut être signalée par des affiches comportant un symbole d'oiseau à droite. Évitez les îles où il y a des colonies (qu'il y ait des affiches ou non).



© TED D'ÉON

Oisillon de la sterne de Dougall



© TED D'ÉON

Organismes à contacter, renseignements, rapports d'observation et possibilités d'intendance

Organismes à contacter : Environnement Canada, 506-364-5044 ou www.ec.gc.ca

Renseignements : www.registrelep.gc.ca ou www.ffdp.ca

Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca

Possibilités d'intendance : Bluenose Coastal Action Foundation, 902-624-9888 ou www.coastalaction.org