



## Herbe à puce

*Toxicodendron radicans* ssp. *radicans*

Statut provincial : En sécurité


ARBUSTES : PLANTES LIGNIFIÉES



Herbe à puce à terre

© DAVID MAZEROLLE

AIRE DE RÉPARTITION  
DE LA POPULATION



🇨🇦 Répartition : N.-B., N.-É.  
Période de floraison : Juin - Juillet

**TAILLE :** Une vigne ou un arbuste, rampant ou grimpant, souvent jusqu'à 1 m de haut. Peut atteindre une hauteur de 2 m ou plus haut, surtout proche des prés salantes du bout sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

**FEUILLES :** Trois feuilles (folioles) en forme ovale, provenant d'une seule tige, pointues au bout, souvent de 5 à 15 cm de large. La feuille du bout a une tige (pétiole) plus longue. Le bord des feuilles est soit denté irrégulièrement vers le bout de la feuille, ou pas denté du tout.



**TIGE :** Lisse, fasciculée ou ligneuse, et rouge brun. Jusqu'à 3 cm de large.

**FLEURS :** Vert blanc avec 5 pétales, 1 à 2 cm de large. Fleurs sont en regroupements de 25 ou plus.

**FRUITS :** Gris blanc, en regroupements de baies (drupes) et suspendus un peu comme des raisins.

**NOTES :** Cette espèce varie en forme.

Elle peut pousser en arbuste, en rampant par terre, ou en grimpant et montant d'autres arbustes et arbres.



En haut d'un arbre

© ALAIN BELLEVEAU



Baies (drupes)

© ALAIN BELLEVEAU



Feuilles rouges de l'automne

© ALAIN BELLEVEAU



© ALAIN BELLEVEAU

### Espèces semblables :

L'herbe à puce de Rydberg (*Toxicodendron rydbergii*) est très semblable sauf qu'il a des feuilles plus larges et la feuille du bout a une tige (pétiole) plus courte. Il se trouve dans des habitats caillouteux ou trempes et rocheux. Il n'y a pas d'autre sous-espèce de *Toxicodendron radicans* en Nouvelle-Écosse. L'amphicarpe bractéolée (*Amphicarpaea bracteata*) a des groupes de trois feuilles et rampe sur les bords des rivières, mais n'a jamais une tige de bois (ligneuse) ou des feuilles dentées. Cette espèce n'est pas abondante au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.

© SEAN BLANEY



L'amphicarpe bractéolée

### Habitat :

Mêmechets (surtout ceux d'érables rouges), bords des mêmechets, fetchaques, bords de la forêt proche des lacs, des ruisseaux, et des prés salantes.

**Point intéressant :** « Feuilles en trois, tige de bois, pas pour moi! » Cette plante peut grièvement irriter la peau et les yeux parce qu'elle produit une toxine organique, l'urushiol. Brûler ou tondre cette plante peut émettre ces toxines dans l'air et peut te faire du tort. Si tu deviens en contact, les feuilles de l'impatiente du Cap (*Impatiens capensis*) peuvent être écrasées et frottées sur la peau pour soulager la douleur et les démangeaisons.