



AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION

Répartition : N.-É.

Période de floraison : Août - Septembre

STATUSPréoccupante Menacée **TAILLE** : 20 à 80 cm de haut.**FUEILLES** : Longues, étroites, 3 à 10 mm de large, droites et montantes à partir de la base.**TIGE** : Tige de fleurs vert pâle, montante à partir de la base, bout de cette tige couvert de poils jaune pâle.**FLEURS** : 10 à 30 fleurs jaune pâle et laineuses, regroupées au bout de la tige de fleur. Chaque bouquet est de 3 à 8 cm de large, chaque fleur est de 10 à 12 mm de large.**FRUITS** : Capsules rondes avec des graines brun rougeâtre.**NOTES** : Racines (rhizomes) rouge vif.

© GODFREY ET WOOTEN (1979)



© ALAIN BELLIVEAU

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY



Regroupement de fleurs



Commencement des fleurs laineuses



Rhizome rouges

© MEGAN CROWLEY

Habitat :

© ALAIN BELLIVEAU

Bords de lacs, composés de terre organique, sable ou gravaille.

Point intéressant : Au Canada, cette espèce ne se trouve qu'à 8 lacs au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.**Espèces semblables** : Si le spécimen n'est pas en fleurs, il peut ressembler aux petits iris versicolores (clajoux) (*Iris versicolor*) et aux lophiolies dorées (*Lophiola aurea*, page 15). La lachnanthe de Caroline a des feuilles de couleur vert vif et des racines (rhizomes) de couleur rouge vif tandis que les autres espèces ont des rhizomes blancs.

La lophiolie dorée (gauche), la lachnanthe de Caroline (droite)