




## Liléopsis de l'Est

*Lilaeopsis chinensis*

Statut provincial : Sensible

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION  
DE LA POPULATION



🇨🇦 Répartition : N.-É.

Période de floraison : Août - Septembre

**STATUS**

Préoccupante 🇨🇦

Vulnérable 🇨🇦



Liléopsis de l'Est dessous la spartine alterniflore

© MEGAN CROWLEY



Petites feuilles rondes

© MEGAN CROWLEY



Commencement  
des fleurs

© MEGAN CROWLEY



Petites fleurs blanches

© MARTIN THOMAS

**TAILLE** : Chaque feuille est 3 à 5 cm de long.

**FEUILLES** : Étroites, arrondies, de couleur vert foncé avec des lignes horizontales pâles. Chaque feuille rencontre la tige individuellement.


**TIGE** : Mince, horizontale (rhizome).

**FLEURS** : 5 à 8 fleurs petites et blanches, avec 5 pétales, poussent au bout de la tige de fleurs qu'émerge verticalement de la tige principale (rhizome).

**FRUITS** : Forme ovale ou arrondie, avec des lignes épaisses le long des bords. Un fruit sec se fend en deux parties, chacune avec une graine (schizocarpe).

**NOTES** : Cette espèce est semi-aquatique, et se trouve régulièrement submergée sous 2 m d'eau de la marée ou complètement exposée.

Ne se trouve que dans six estuaires et un lac d'estuaire en Nouvelle-Écosse.



© COLLECTIONS DU MUSÉE DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

### Habitat :

Dans le platin vaseux de la zone intertidale des rivières et des lacs d'estuaires.

**Point intéressant** : Cette espèce a premièrement été découverte en Nouvelle-Écosse par le botaniste notable Merritt Fernald de Harvard University. Fernald dirigeait des expéditions dans une grande partie du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et contribuait considérablement à la recherche sur la flore de cette province.

**Espèces semblables** : Aucune