


AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION

🇨🇦 Répartition : N.-É.
Période de floraison : Juin - Juillet


TAILLE : 30 à 60 cm de haut.

FEUILLES : Forme ovale et dentées finement. Le dessus a des poils rugueux. En paires (opposées) sur la tige et attachées directement (sans pétiole) à la tige, et 2 à 7 cm de long.

TIGE : Peu de poils (surtout proche des feuilles), carrée, assez fasciculée, pas branchue.

FLEURS : Une ou plusieurs fleurs rose violet avec des étamines longues et jaunes au centre. L'arrière des pétales est souvent épineux.

FRUITS : Violets et en forme de cruche avec quatre dents triangulaires à l'ouverture, 7 à 10 mm de long, la texture varie et peut être épineuse ou lisse.



© BRITTON ET BROWN (1911)

Habitat :

Zones ouvertes et trempes, et bords de lacs rocheux.

Point intéressant : Le fruit en forme d'urne a été comparé à une petite cruche à crème par le poète et naturaliste, Henry David Thoreau.

Espèces semblables : La sabatie de Kennedy (*Sabatia kennedyana*, page 27) et le coréopsis rose (*Coreopsis rosea*, page 4) ont chacun des fleurs rosâtres au centre jaune. Le coréopsis rose a 8 pétales (rayons) et aucune étamine jaune, et la sabatie de Kennedy a de 9 à 11 pétales qui sont jaunes à la base.

Rhexie de Virginie

Rhexia virginica



© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY

© MEGAN CROWLEY



L'arrière épineux des pétales



Bourgeon de fleur épineux

© MEGAN CROWLEY



Feuilles en paires

© MEGAN CROWLEY



Fruit en forme de cruche