




Spiranthe de Case de la Nouvelle-Écosse
Spiranthes casei var. *novaescotiae*

Statut provincial : Sensible

HERBACÉES : PLANTES NON LIGNIFIÉES

AIRE DE RÉPARTITION
DE LA POPULATION



Fleurs en spirale, grands écarts entre les fleurs

© BERNARD FORSYTHE (ALL)



La spiranthe penchée



La spiranthe jaunâtre



La spiranthe de Case de la Nouvelle-Écosse



La spiranthe de Case

Habitat :

Terres acides et sableux, bords de chemins, parcs, et terres arides ouvertes.

Point intéressant : Le genre *Spiranthes* (Latin) veut dire « fleur en spirale ».

Espèces semblables : Il y a quatre spiranthes qui fleurissent en automne. La spiranthe de Case (*Spiranthes casei* var. *casei*) est plus étroite avec des fleurs plus petites, la babine d'en bas de la fleur est large avec des bords dépeignés, et la babine d'en haut saille. Ses feuilles sèchent durant la période de floraison. La spiranthe penchée (*Spiranthes cernua*) est typiquement plus courte avec des fleurs blanches immaculées et une babine d'en bas large. Cette dernière espèce c'est la plus commune. La spiranthe jaunâtre (*Spiranthes ochroleuca*) est plus haute, avec des fleurs jaunâtres plus larges et qu'ont la « bouche » très ouverte. La spiranthe de Case et la spiranthe de Case de la Nouvelle-Écosse ont des grands écarts entre les fleurs. La spiranthe penchée et la spiranthe jaunâtre n'en ont pas.

TAILLE : 20 à 40 de haut.

FEUILLES : 2 à 4 feuilles en forme de lance qui s'attachent à la base de la plante. Pas dentées, 5 à 15 cm de long, 8 à 12 mm de large, avec plusieurs veines parallèles d'un bout à l'autre de chaque feuille.

TIGE : Vert vif, lisse, mince, et debout.

FLEURS : Tubulaires arrangées en spirale au fait de la plante.

Vertes ou blanc crémeux, un peu penchées vers le bas, divisées en 6 parties.


La babine (pétale) d'en bas est pointue, épaisse et ses bords sont un peu roulés vers l'intérieur.

Les sépales sont de 5 à 7 mm de long.

FRUITS :

Petites graines.


NOTES : Cette variété se trouve seulement en Nouvelle-Écosse. Elle pousse souvent avec le genre de mousse *Polytrichum*.



© S. LAURIE BOURQUE, J. M. REDDOCH ET A. H. REDDOCH

La spiranthe de Case

© BERNARD FORSYTHE



De gauche à droite : La spiranthe jaunâtre, penchée, et de Case