

Martinet ramoneur

Chaetura pelagica

STATUT

Menacée




En voie de disparition



13

Nouvelle-Écosse

Moins d'un millier d'individus vivent dans les provinces Maritimes. La population de la Nouvelle-Écosse connaît un déclin rapide. Le martinet ramoneur hiverne en Amérique du Sud.



Aire de répartition de la population



© PAUL & GEORGEAN KYLE

Habitat

Avant l'arrivée des Européens en Amérique du Nord, le martinet ramoneur nichait dans le tronc des gros arbres creux, un habitat qu'il utilise encore de nos jours. Il niche également dans des cheminées abandonnées où les températures sont relativement stables. Le martinet ramoneur cherche surtout sa nourriture près des lacs et des marécages où abondent les insectes, dont il se nourrit en plein vol.



© PAUL & GEORGEAN KYLE



© BRENNAN CAVENHILL

Centre d'interprétation du martinet ramoneur
Robie Tufts à Wolfville

Description de l'espèce

Le martinet ramoneur est un petit oiseau (12 à 14 cm) dont le plumage est brun foncé, à l'exception de sa gorge de couleur plus pâle. Son corps est long et mince. Ses ailes sont longues, étroites et pointues et dépassent sa courte queue quand elles sont repliées. Son vol est rapide et saccadé. Le mâle, la femelle et les jeunes ne présentent pas de différences marquées.



On observe le martinet ramoneur de la mi-avril jusqu'en septembre à l'aube et à la brunante en Nouvelle-Écosse.

Faits intéressants

- Le martinet ramoneur est monogame et ne se reproduit pas avant sa deuxième année.
- On estime la population du Canada à moins de 12 000 individus.
- Il peut manger plus d'un millier d'insectes par jour.
- Il ne peut pas prendre son envol à partir du sol!



© GREG LASLEY

Menaces à la survie de l'espèce

- La diminution du nombre d'aires de reproduction et de repos en raison de l'exploitation forestière, qui réduit le nombre de gros arbres creux.
- La destruction de vieux cheminées où le martinet ramoneur peut faire son nid.
- La pollution lumineuse, ainsi que l'utilisation de pesticides qui réduit la nourriture disponible.



© STEPHEN FLEMING



© PAUL & GEORGEAN RYLE



Espèces similaires

Remarque :

Les hirondelles de la Nouvelle-Écosse ont une poitrine blanchâtre et un vol plus régulier que le martinet ramoneur.

Hirondelle à front blanc :

Taille similaire (13 cm); dos bleu, ailes et queue brunes; ventre et front blancs; petit bec noir.



Hirondelle de rivage :

Taille similaire (12 cm); dos brun et ventre blanc; bande brune étroite sur la poitrine.



Hirondelle rustique :

Taille similaire (13 cm); dos bleu, face brune et ventre chamois; queue pointue plus longue.



Ce que vous pouvez faire

Exploitants forestiers : ne coupez pas les gros arbres morts encore sur pied. Tout le monde : signalez toute observation (en particulier les lieux de nidification), éteignez les lumières extérieures pour réduire la pollution lumineuse, en plus de diminuer votre consommation d'énergie, d'économiser de l'argent et de sauver les oiseaux! Appuyez des pratiques forestières durables et la restauration de l'habitat.

Organismes à contacter, renseignements et rapports d'observation

Organismes à contacter : Environnement Canada, 506-364-5044 ou www.ec.gc.ca

Renseignements : www.registrelep.gc.ca, www.chimneyswifts.org (en anglais seulement)

Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca