

Quiscale rouilleux

Euphagus carolinus nigrans

STATUT

Préoccupante




Aucune désignation



29

Nouvelle-Écosse

Il est rarement observé dans la province et on ne connaît pas la taille de sa population. Il hiverne au centre et à l'est des États-Unis.



Aire de répartition de la population

Habitat

Au Canada, la sous-espèce *nigrans* se trouve uniquement en Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec. Il niche d'avril à août dans les forêts de conifères, près des cours d'eau, des marais et des tourbières. On le trouve aussi près des étangs de castors.



© STUART SLATTEN, CANARDS ILLIMITÉS CANADA

Description de l'espèce

Le quiscale rouilleux est un oiseau de taille moyenne (21 à 25 cm). Il a des yeux jaunes au contour jaune pâle et un bec étroit et pointu. Le mâle est d'un noir lustré avec une touche de vert, et la femelle est d'un gris brun foncé. Ils ont les pattes et les pieds noirs et la queue arrondie.



© GOUVERNEMENT DE L.N.-L., ROGER TORNY PETERSON



© BECKY STEWART



© BECKY STEWART

Étang de castor

On l'observe près des cours d'eau, dans des forêts de conifères. Il est plutôt solitaire, contrairement aux autres espèces de quiscales grégaires.

Faits intéressants

- On estime que la population reproductrice de quiscales rouilleux au Canada constitue 70 % de la population mondiale!
- Cette espèce a connu un déclin de 85 % au cours des 40 dernières années.
- Plusieurs autres espèces d'oiseaux partageant le même habitat et le même type d'alimentation (insectes) ont subi un déclin semblable (p. ex. le moucherolle à côtés olive et le martinet ramoneur).

Espèces similaires

Quiscale bronzé :

Plus gros (28 à 34 cm); bec et queue plus longs; plumage noir et irisé de vert et de violet sur la tête, le cou et la poitrine; queue en forme de V.



Vacher à tête brune :

Plus petit (17 à 22 cm); bec et queue plus courts; yeux foncés. Mâle : tête brune; corps d'un noir lustré et irisé de vert bleu. Femelle : entièrement brun gris.



Mâle



Femelle

Menaces à la survie de l'espèce

- La conversion des milieux humides à des fins agricoles ou résidentielles.
- La perte de l'aire d'hivernage de la vallée du Mississippi (réduction de 80 % au cours de 150 dernières années).
- Les programmes de lutte antiaviaire aux États-Unis.

Ce que vous pouvez faire

Signalez toute observation de l'espèce ou la présence de nids aux responsables de l'Atlas des oiseaux nicheurs des Maritimes (www.mba-aom.ca/) et du Relevé de nids dans les Maritimes (tony_erskine@ec.gc.ca).

Organismes à contacter, renseignements et rapports d'observation

Organismes à contacter : Environnement Canada, 506-364-5044 ou www.ec.gc.ca

Renseignements : www.cosepac.gc.ca

Rapports d'observation : 1-866-727-3447 ou sightings@speciesatrisk.ca



© SEABROOK/LECKIE

Femelle



© PETER HOPE